

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Fruto siempre armado con gloquidios en las costillas, de 4-6 rayos cortos, patentes a reflejos, con escasa pubescencia estrellada
B. flabilis
- 1'. Fruto nunca armado con gloquidios, con pubescencia estrellada o glabro 2
- 2(1'). Frutos con una cámara de aire entre el endocarpio y exocarpio que colapsa al secarse el fruto resultando en un dorso deprimido; frutos generalmente de 3,5-6 mm de largo (excepto *B. incana*) 3
- 2'. Frutos con el endocarpio unido al exocarpio y con dorso plano o cóncavo; frutos menores de 3 mm de largo 5
- 3(2). Hojas palmatisectas, lóbulos enteros a 3-partidos, lineales a angostamente elípticos, ápice con pelo plumoso; con pelos de 6-12 rayos en ambas caras
B. ruiz-lealii
- 3'. Hojas palmatipartidas, lóbulos enteros a trifidos, ovados a anchamente ovados, elípticos a anchamente elípticos, u obovados a anchamente obovados, ápice mucronulado o ciliado; con pelos simples o de 2-4 rayos en la cara adaxial y pelos de 4-8 rayos en la cara abaxial 4
- 4(3'). Hojas en la cara adaxial con pelos bifurcados o simples, en la cara abaxial con pelos de 4-5 rayos; todas las umbelas pedunculadas; involucre ausente o muy reducido; flores blanco amarillentas; pétalos glabros; frutos de 3,5-6 mm de largo
B. hieronymusii
- 4'. Hojas en la cara adaxial estrigosas con pelos de 2-4 rayos, en la cara abaxial con pelos de 6-8 rayos; todas las umbelas o las distales subsésiles; involucre de varias brácteas lanceoladas; flores amarillo-verdosas o púrpuras; pétalos estrellado-pubescentes en el dorso; frutos de 1,5-2 mm de largo
B. incana
- 5(2'). Hojas 3-7 palmatifidas, ovado-acuminadas a ovado-reniformes; tallos conspicuamente inflados
B. platanifolia
- 5'. Hojas 5-11 palmatipartidas a palmatisectas, orbicular-reniformes o anchamente ovadas; tallos no inflados 6
- 6(5'). Hojas con 5-11 lóbulos con senos muy estrechos, escasamente pubescentes a glabras; involucre ausente
B. venturii
- 6'. Hojas con 5-9 lóbulos con senos anchos, pubescentes a densamente pubescentes; involucre presente 7
- 7(6'). Cara abaxial de las hojas y frutos pubescentes, no tomentosos; lóbulo central de las hojas por lo general notablemente más largo que los otros, lóbulos más anchos en la base; pétalos glabros o con 1-3 pelos estrellados
B. lobata
- 7'. Cara abaxial de las hojas y frutos inmaduros tomentosos; lóbulos de las hojas basales generalmente subiguales, más anchos en la mitad; pétalos generalmente con varios pelos estrellados en el dorso
B. tropaeolifolia