

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Cápsula dehiscente por 3 valvas apicales

*C. pulchella*

1'. Cápsula dehiscente a través de hendiduras longitudinales ubicadas por debajo de la inserción de los sépalos

2

2(1'). Escamas nectaríferas sin apéndices dorsales (ocasionalmente 2-3 filamentosos en *C. coronata*)

3

2'. Escamas nectaríferas con apéndices dorsales conspicuos o reducidos (ocasionalmente ausentes en *C. chuquitensis*)

4

3(2). Tallos decumbentes o algo ascendentes

*C. coronata*

3'. Tallos volubles

*C. sleumeri*

4(2'). Plantas acaulescentes (excepcionalmente con tallos bien desarrollados en *C. rosulata* subsp. *taraxacoides*)

5

4'. Plantas caulescentes

6

5(4). Plantas no rizomatosas; flores horizontales o deflexas, largamente pedunculadas; pétalos profundamente cimbitiformes

*C. rosulata* subsp. *taraxacoides*

5'. Plantas rizomatosas; flores erectas, subsésiles; pétalos levemente cocleariformes a planos

- C. nivalis*
- 6(4'). Corola brevemente acampanada, amarilla
- C. boliviana*
- 6'. Corola globosa, roja, rosada, anaranjada o amarilla
- 7
- 7(6'). Tallos erectos
- 8
- 7'. Tallos volubles o decumbentes
- 9
- 8(7) Hojas con abundantes setas y tricomas escábridos cortos; concoloras
- C. chuquitensis*
- 8'. Hojas con setas escasas o ausentes y tricomas escábridos largos; discolores
- C. mollis*
- 9(7'). Escamas nectaríferas con ápice engrosado, diferenciado, prolongado en dos engrosamientos dorsales en forma de arco
- 10
- 9'. Escamas nectaríferas con ápice engrosado no diferenciado y no prolongado en dos engrosamientos dorsales en forma de arco
- 11
- 10(9). Hojas bipinnatisectas
- C. spegazzinii*
- 10'. Hojas enteras a pinnatilobadas, pinnatífidas a pinnatisectas
- 12
- 11(9'). Hojas con 3(-5) folíolos libres, corola rojo-grisácea
- C. hibiscifolia*

11'. Hojas generalmente simples, enteras, pinnatilobadas a pinnatisectas, a veces con los segmentos proximales libres; corola amarilla, blanca o anaranjada

13

12(10'). Escamas nectaríferas anaranjado claras, ápice y arcos dorsales púrpuras; apéndices dorsales laminares, angostamente espatulados a filiformes; cápsula angostamente oblonga

*C. cernua*

12'. Escamas nectaríferas blancas, con el ápice y arcos dorsales rojos; apéndices dorsales espatulados; cápsula obcónica a claviforme

*C. clavata*

13(11'). Corola acampanada

*C. canarinoides*

13'. Corola estrellada o cortamente acampanada

14

14(13'). Cápsula recta, obcónica o claviforme

*C. dumetorum*

14'. Cápsula espiralada, oblonga, cilíndrica a subcilíndrica

15

15(14'). Escamas nectaríferas con apéndices dorsales subrectangulares, castaños, púrpuras a rojo intenso; pétalos anaranjados, raro amarillos, blanco amarillentos o blancos

*C. lateritia*

15'. Escamas nectaríferas con apéndices dorsales espatulados, con extremo distal castaño rojizo y base color amarillo claro; pétalos color amarillo claro o blancos

*C. aconquijae*