

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Arbustos con indumento de tricomas en su mayoría ramificados, más o menos denso
2
- 1'. Arbustos o árboles glabros o con indumento de tricomas en su mayoría simples
4
- 2(1). Plantas escandentes; epi- e hipofilo glabros; brácteas persistentes de 2-5(-8) mm; cáliz con tricomas sobre los dientes
C. reflexum
- 2'. Plantas no escandentes; epifilo glabro o algo pubescente, hipofilo lanuginoso o con tricomas estrellados; brácteas caedizas; cáliz glabrescente o totalmente cubierto de indumento tomentoso de tricomas estrellados
3
- 3(2'). Hojas glabras y brillantes en el epifilo; tricomas estrellados en hipofilo, pecíolos y ramas; todas las piezas florales cubiertas de tricomas estrellados
C. strigilatum
- 3'. Hojas laxamente pubescentes en el epifilo; tricomas ramificados en hipofilo, pecíolos, ramas y tallos integrando un indumento blanquecino y lanuginoso; cáliz glabrescente, corola glabra
C. velutinum
- 4(1'). Árboles o arbustos erectos; porción libre de los filamentos ca. 3 mm o mayor
5
- 4'. Arbustos con ramas apoyantes; porción libre de los filamentos de 0,1-0,2 mm
C. guaraniticum
- 5(4). Pedúnculos florales negruzcos; lóbulos corolinos redondeados
C. kunthii

5'. Pedúnculos florales verdosos, nunca negruzcos; lóbulos corolinos nunca redondeados

6

6(5'). Brácteas persistentes, notables, ca. 10 mm

C. bracteatum

6'. Brácteas caedizas

7

7(6'). Interior corolino con denso anillo basal de tricomas; filamentos estaminales con apéndices alargados ($\pm 0,3$ mm) pubescentes, ubicados un poco por debajo del punto de inserción a la corola

C. mariquitense

7'. Interior corolino nunca con anillo basal de tricomas; filamentos estaminales sin apéndices alargados

8

8(7'). Inserción de los estambres por debajo de la semialtura del tubo corolino; hipofilo pubescente, velutino a tomentoso

C. lorentzianum

8'. Inserción de los estambres entre la semialtura y el $\frac{1}{4}$ superior del tubo corolino; hipofilo glabro

9

9(8'). Filamentos con su parte libre geniculada solamente en el ápice adjunto a la antera; anteras de 0,5-0,7 mm

C. laevigatum

9'. Filamentos con su parte libre bigeniculada: en el ápice adjunto a la antera y en la inserción al tubo corolino; anteras de 0,7-1,5 mm

10

10(9'). Cáliz acampanado ca. 3 mm; anteras ca. 0,7 mm; porción libre de los filamentos ca. 5 mm; pedúnculos y cáliz glabros

C. euanthes

10'. Cáliz tubuloso ca. 5 mm; anteras de 1-1,5 mm; porción libre de los filamentos de 5-10 mm; pedúnculos y cáliz glabros o glabrescentes, ocasionalmente cubiertos de denso indumento blanquecino, lanuginoso

C. parqui