

CHAPTALIA

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Aquenios con un rostro muy breve; escapo floral de menos de 5 cm de largo
C. exscapa
- 1'. Aquenios largamente rostrados; escapo floral de más de 5 cm de largo
2
- 2(1'). Hojas lirado-pinnatífidas o subliradas
3
- 2'. Hojas enteras, sinuadas, crenadas, dentadas o retrorso-aserradas
5
- 3(2). Escapos florales sin brácteas; aquenios con rostro más largo que la parte seminífera
C. nutans
- 3'. Escapos florales con brácteas; aquenios con rostro más corto que la parte seminífera
4
- 4(3'). Hojas subliradas con un solo lóbulo terminal, sin lóbulos laterales
C. modesta
- 4'. Hojas lirado-pinnatífidas con lóbulo terminal y varios lóbulos laterales
C. similis
- 5(2'). Capítulos siempre erectos; hojas de 5-12 mm de ancho
C. piloselloides
- 5'. Capítulos nutantes cuando jóvenes y al fructificar (más o menos erguidos en la antesis);
hojas de más de 12 mm de ancho
6
- 6(5'). Escapos con numerosas brácteas dispersas

C. arechavaletae

6'. Escapos florales sin brácteas o con 1-7 brácteas en la parte superior

7

7(6'). Hojas oblanceoladas, agudas, enteras o levemente denticuladas en el margen; raíces numerosas y delgadas, de color gris-amarillento

C. integerrima

7'. Hojas obovadas, elípticas u oblongo-lanceoladas, crenado-dentadas, retrorso-aserradas o ligeramente sinuadas en el margen; raíces principales gruesas, de color rojizo o negruzco

8

8(7'). Hojas obovadas o elípticas, de 2,5-5 cm de ancho (relación largo: ancho de 2,5: 1); raíces rojizas; flores pistiladas externas con corolas subliguladas (con labio interno)

C. sinuata

8'. Hojas oblongo-lanceoladas, de 1-3 cm de ancho (relación largo: ancho de 4-6: 1); raíces negruzcas; flores pistiladas externas con corolas subliguladas o liguladas (con o sin labio interno)

C. ignota