

CYNODON

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Lígulas membranáceas ca. 1 mm de largo, de ápice fimbriado; lemma con la carena brevemente alada; raquis de los racimos aplanados

C. incompletus var. *hirsutus*

1'. Lígulas membranáceo-ciliadas hasta de 0,5 mm de largo; lemma con la carena no alada; raquis de los racimos triquetros

2

2(1'). Prefoliación conduplicada; vainas comprimidas lateralmente

C. dactylon

2'. Prefoliación convoluta; vainas no comprimidas lateralmente

3

3(2'). Inflorescencias con 6-15 racimos, de 6-10 cm de largo

C. plectostachyus

3'. Inflorescencias con 3-6(-7) racimos, de 1,5-7,5 cm de largo

4

4(3'). Gluma superior aristulada

C. mucronatus

4'. Gluma superior mútica

5

5(4'). Gluma superior menor o igual que $\frac{1}{2}$ del tamaño del antecio

C. laeviglumis

5'. Gluma superior mayor que $\frac{1}{2}$ del tamaño del antecio

6

6(5'). Lemma conspicuamente ciliolada en la carena y generalmente también en los bordes

C. maritimus

6'. Lemma brevemente ciliolada en la carena y con los bordes glabros a subglabros

7(6'). Hojas densamente hirsutas; espiguillas de 2,5-3 mm de largo

C. hirsutissimus

7'. Hojas laxamente pilosas hasta glabras o subglabras; espiguillas de 2-2,5 mm de largo

C. affinis