

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Corola infundibuliforme de 5-10 mm de largo; estambres insertos en la base de los lóbulos corolinos; polen blanco a azul

2

1'. Corola rotácea a campanulada de 10-15 mm de largo o mayor; estambres insertos en el tubo corolino; polen amarillo

3

2(1). Hojas pinnatilobadas a pinnatisectas, generalmente con pubescencia lanosa, carnosas; segmentos foliares de 0,9-2 mm de ancho; cáliz de igual o casi de igual largo que el fruto maduro

*G. crassifolia*

2'. Hojas pinnatisectas a bipinnatisectas, sin pubescencia lanosa, membranáceas; segmentos foliares de 0,3-0,5(-0,6) mm de ancho, lineares, agudos; cáliz generalmente sobrepasando en longitud al fruto maduro

*G. laciniata*

3(1'). Hojas pinnatipartidas con segmentos lineares; flores hasta de 15 mm de largo, corola con los lóbulos obovados y agudos, azul-pálida; microendemismo de Catamarca

*G. castellanosii*

3'. Hojas pinnatisectas con segmentos oblongos; flores generalmente de más de 15 mm de largo, corola con los lóbulos ovados y redondeados, liláceas; endémica de Mendoza y San Juan

*G. foetida*