

JUNELLIA

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Arbustos bajos o caméfitos; base del estilo ensanchada y cubriendo total o parcialmente el ápice del fruto
2
- 1'. Arbustos no caméfitos; base del estilo no ensanchada y más o menos hundida en el ápice del fruto
25
- 2(1). Cáliz con pelos largos, blancos, rectos, cubriendo casi todo el tubo corolino
J. pappigera
- 2'. Cáliz sin pelos largos, blancos
3
- 3(2'). Caméfitos o arbustos inermes; hojas generalmente homomorfas, nunca espiniformes, sin ápice punzante
4
- 3'. Caméfitos o arbustos espinosos; hojas homomorfas espiniformes o dimorfas, las de los macroblastos espiciformes o al menos con ápice punzante, las de los braquiblastos tetrásticas, carnosas
15
- 4(3). Par superior de estambres con apéndices conectivos; corola glabra exteriormente; hojas generalmente 3-lobadas a 3-partidas; caméfitos
J. micrantha
- 4'. Par superior de estambres sin apéndices conectivos; corola con pubescencia variable exteriormente; hojas enteras o 3-lobadas a 3-partidas; arbustos bajos o caméfitos
5
- 5(4'). Florescencias 1-4-floras; caméfitos

	6
5'. Florescencias con más de 4 flores; caméfitos o arbustos bajos	
	9
6(5). Hojas enteras	
	7
6'. Hojas 3-lobadas, algunas enteras, lóbulos con ápice redondeado no punzante	
	<i>J. aretioides</i>
7(6). Cáliz glabro; hojas generalmente tetrásticas, glabras o apenas ciliadas en el margen	
	<i>J. silvestrii</i>
7'. Cáliz con pubescencia variada sobre la superficie; hojas no tetrásticas, pubescentes o hirsutas	
	8
8(7'). Cáliz pubérulo en la zona apical; clusas con la cara adaxial papilosa	
	<i>J. minima</i>
8'. Cáliz pubescente en toda su superficie; clusas generalmente con la cara adaxial lisa	
	<i>J. uniflora</i>
9(5'). Caméfitos hasta de 5 cm de alto; hojas enteras, 3-partidas o 3-lobadas	
	10
9'. Arbustos de desarrollo variable; hojas generalmente enteras, a veces las basales 3-lobadas	
	14
10(9). Hojas generalmente todas enteras, de margen revuelto	
	11
10'. Hojas 3-partidas o 3-lobadas	
	12

11(10). Hojas lineares, pubérulas; cáliz y tubo corolino hispíduos, el tubo apenas más largo que el cáliz

J. azurelloides

11'. Hojas ovadas a oblongas, pilosas; cáliz tomentoso, tubo corolino viloso, el doble de largo que el cáliz

J. patagonica

12(10'). Hojas glabras

J. congesta

12'. Hojas con pubescencia variable, hispido-glandulosas o estrigosas

13

13(12'). Hojas con pubescencia adpresa, lóbulos enteros; corola menos de dos veces la longitud del cáliz, exteriormente con pelos aplicados retrorsos; brácteas florales enteras

J. tridactylites

13'. Hojas hispídas, lóbulos divididos; corola dos veces la longitud del cáliz, exteriormente glabra; brácteas florales enteras o 3-partidas

J. digitata

14(9'). Hojas con pelos cortos simples y glandulares; tallos con pubescencia escabrosa, con pelos glandulares

J. succulentifolia

14'. Hojas con pelos largos, blanquecinos, no glandulares; tallos con pelos adpreso-retrorsos, sin pelos glandulares

J. thymifolia

15(3'). Hojas homomorfos, espiniformes, enteras; caméfitos pulvinados

J. erinacea

15'. Hojas dimorfos; arbustos o caméfitos pulvinados

16

16(15'). Hojas de los macroblastos en su mayoría enteras	17
16'. Hojas de los macroblastos 3-partidas o 3-sectadas, punzantes, a veces también con hojas enteras en el mismo ejemplar	21
17(16). Florescencias 2-floras (raro 3-4-floras) en los braquiblastos	18
17'. Florescencias 3-4 a plurifloras en los macroblastos o en braquiblastos alargados	20
18(17). Arbustos de 30-80 cm de alto; clusas brevemente aladas	<i>J. seriphioides</i>
18'. Caméfitos hasta de 30 cm de alto; clusas no aladas	19
19(18'). Brácteas híspidas en la cara externa; cáliz de 3,5-4 mm de largo; gineceo de 3,5-4,5 mm de largo	<i>J. spissa</i>
19'. Brácteas pubescentes en ambas caras; cáliz de 4,5-5 mm de largo; gineceo de 6,5-7 mm de largo	<i>J. caespitosa</i>
20(17'). Brácteas connadas, ovadas, pubescentes; cáliz híspido sobre los nervios; hojas recurvas, a veces algunas hojas más o menos rectas	<i>J. connatibracteata</i>
20'. Brácteas no connadas, ovadas o angostamente ovadas, agudas hasta acuminadas, pilosas o glabras; cáliz pubérulo a pubescente o glabro; hojas rectas	<i>J. toninii</i>

21(16'). Clusas rostradas; hojas de los braquiblastos 3-lobadas; brácteas enteras; tallos con pubescencia adpresoretrorsa; arbustos bajos

J. bisulcata

21'. Clusas no rostradas; hojas de los braquiblastos enteras o 2-3-partidas; brácteas enteras o 3-partidas; tallo con pubescencia hispida, pelos patentes o glabrescentes; arbustos bajos o caméfitos pulvinados

22

22(21'). Brácteas 3-partidas; hojas de los braquiblastos 3-partidas

23

22'. Brácteas enteras; hojas de los braquiblastos enteras o 3-partidas

24

23(22). Monobotrios 3-10-floros; brácteas de 4,5-7 mm de largo; dientes del cáliz de 0,5 mm de largo, con ápice atenuado

J. odonellii

23'. Monobotrios 2-3-floros; brácteas de 11,5-12 mm de largo; dientes del cáliz de 1,5 mm de largo, con ápice acuminado

J. ulicina

24(22'). Arbustos con ramas erguidas, hasta de 1 m de alto; hojas de los braquiblastos generalmente enteras o 2-lobadas o 2-3-sectadas, punzantes; tallos con pubescencia patente

J. juniperina

24'. Arbustos postrados o caméfitos; hojas de los braquiblastos todas enteras, no punzantes; tallos con pubescencia patente o glabrescentes

J. toninii

25(1'). Inflorescencias en monobotrios; hojas enteras, algunas ocasionalmente 3-fidas

J. spathulata

25'. Inflorescencias en pleiobotrios, ocasionalmente monobotrios; hojas nunca enteras

26

26(25'). Hojas lobadas, ocasionalmente 3-partidas; paraclados aglutinados aparentando una única cabezuela compleja

27

26'. Hojas partidas o sectadas; inflorescencia en monobotrios o pleiobotrios con paraclados abiertos, no aglutinados

28

27(26). Estambres sin apéndices conectivos

J. ballsii

27'. Estambres superiores con apéndices conectivos notorios, generalmente sobrepasando la corola

J. origenes

28(26'). Estambres superiores con apéndices conectivos; hojas 2-3-pinnatipartidas, lacinias de 2-3 mm de ancho; tubo corolino no glanduloso

J. crithmifolia

28'. Estambres superiores sin apéndices conectivos; hojas 5-sectadas a 2-3-pinnatisectadas, lacinias filiformes de 1 mm de ancho; tubo corolino glanduloso externamente

J. hookeriana