

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Flores 6-meras; ovario 3-carpelar, estilo de ápice 3-fido, estigma espátulo-recurvado
2
- 1'. Flores 4-meras; ovario 4-carpelar, estilo entero, estigma 4-lobado
4
- 2(1). Mericarpos comprimidos dorsiventralmente, obcordiforme, cara ventral amplia; semilla comprimida, levemente obtuso-angulosa, con la cara ventral casi plana
R. brasiliensis
- 2'. Mericarpos de contorno obovado, cara ventral estrecha, linear; semilla de contorno obovado, surcadas en la cara ventral a cada lado de la línea media
3
- 3(2'). Corola de (8-)12-20(-25) mm de largo; mericarpos con papilas subglobosas, romas, densas, distribuidas uniformemente sobre la cara dorsal
R. grandiflora
- 3'. Corola de 6-7 mm de largo; mericarpos con papilas ± cónicas y/o aciculares, agudas, más largas en la mitad apical de la cara dorsal
R. scabra var. *chacoensis*
- 4(1'). Hojas con láminas elípticas, elíptico-ovadas, a veces subcirculares, con pubescencia hirsuta en ambas caras, venas secundarias evidentes en cara abaxial; brácteas ovadas a obovadas, más anchas que las hojas; lóbulos del cáliz mayores o iguales a la corola
R. humistrata
- 4'. Hojas con láminas triangulares, ovadas, angostamente elípticas a lineares, adaxialmente glabras o con pelos dispersos, abaxialmente hirsutas, venas secundarias no evidentes; brácteas linear-elípticas a angostamente elípticas o triangulares; lóbulos del cáliz menores a la porción media de la corola
5
- 5(4'). Tallos hasta de 8 cm de largo; hojas de 0,5-0,8 mm de ancho; vaina estipular con lacinias de 3-4 mm de largo; cáliz con lóbulos iguales, de contorno linear; flores casmógamas; anteras de contorno subcircular
R. pedicellata
- 5'. Tallos hasta de 15 cm de largo; hojas de (1-)2-7(-8) mm de ancho; vaina estipular con lacinias de 4-7 mm de largo; cáliz con lóbulos desiguales, de contorno triangular-subulado; flores casmógamas y cleistógamas, anteras de contorno oblongo-ovado

R. stellaris